



Acepran® Gotas

Neuroléptico – Tranquilizante

DESCRIÇÃO

A Acepromazina é um derivado fenotiazínico mais comumente utilizado como medicação pré-anestésica, sedativo e tranquilizante. Em pequenos animais, os derivados fenotiazínicos podem produzir efeitos antieméticos.

INDICAÇÃO

Acepran® gotas é indicado para cães e gatos como sedativo e tranquilizante para facilitar procedimentos diagnósticos, contenção para exames e radiografias, tratamento de feridas e abscessos, sondagem uretral e nos casos onde se deseja obter um efeito tranquilizante e de indiferença aos estímulos excitantes do meio. **Acepran® gotas** é especialmente indicado para transporte de animais, pois promove tranquilização, sonolência e também propriedade antiemética, típica dos derivados fenotiazínicos.

CONTRAINDICAÇÃO

É PRECISO TER CAUTELA AO ADMINISTRAR ACEPROMAZINA A PACIENTES FRACOS, DEBILITADOS, JOVENS, IDOSOS, CARDIOPATAS E COM COMPROMETIMENTO HEPÁTICO, PARA MINIMIZAR OS SEUS EFEITOS ADVERSOS. TAMBÉM SE DEVE EVITAR A SUA INTERAÇÃO COM ORGANOFOSFORADOS, PORQUE AUMENTAM A TOXICIDADE DAS FENOTIAZINAS. NÃO UTILIZAR EM FÊMEAS GESTANTES E LACTANTES. UTILIZAR COM CUIDADO EM ANIMAIS COM HISTÓRICO DE CONVULSÕES. NÃO UTILIZAR EM ANIMAIS QUE APRESENTAM PROBLEMAS DE DISTONIA OU QUE APRESENTAM EFEITOS EXTRAPIRAMIDAIS COM USO DE FENOTIAZÍNICOS. A ACEPROMAZINA PODE POTENCIALIZAR OUTROS FÁRMACOS QUE CAUSAM VASODILATAÇÃO. PODE AUMENTAR O RISCO DE CONVULSÕES QUANDO ADMINISTRADA EM CONJUNTO COM OUTROS AGENTES QUE DIMINUEM O LIMIAR CONVULSIVO. A ABSORÇÃO ORAL DA ACEPROMAZINA PODE SER REDUZIDA EM ANIMAIS TRATADOS COM MISTURAS ANTI-DIARRÉICAS E ANTIÁCIDOS (EXEMPLO: CAULIM, PECTINA E BISMUTO). A ACEPROMAZINA ESTÁ CONTRAINDICADA EM CASOS DE CHOQUES ENDOTÓXICOS OU TRAUMÁTICOS, DEVIDO AO RISCO DE QUEDA CRÍTICA NA HIPOTENSÃO. A ADMINISTRAÇÃO DE ADRENALINA É CONTRAINDICADA EM

ANIMAIS MEDICADOS COM FENOTIAZÍNICOS, POIS ACARRETA MAIOR DEPRESSÃO DA PRESSÃO ARTERIAL. NESTES CASOS, DEVE SER UTILIZADA COMO DROGA DE ELEIÇÃO A NORADRENALINA. A ACEPROMAZINA DEVE SER USADA COM CAUTELA DURANTE ANESTESIAS EPIDURAIS DEVIDO A POTENCIALIZAÇÃO DOS EFEITOS HIPOTENSIVOS.

EFEITOS COLATERAIS

AS RAÇAS BRAQUICEFÁLICAS, TAIS COMO PUG, PEQUINÊS, BULLDOGUE E BOXER, PODEM APRESENTAR SÍNCOPE APÓS A ADMINISTRAÇÃO DE ACEPROMAZINA, DEVIDO A UM BLOQUEIO SINOATRIAL RESULTANTE DE IMPLICAÇÃO VAGAL. ESTA RESPOSTA PODE SER PREVENIDA PELA ADMINISTRAÇÃO DE UMA DOSE BAIXA DE ACEPROMAZINA E PELA INJEÇÃO CONCOMITANTE DE UM ANTICOLINÉRGICO COMO A ATROPINA. OS EFEITOS COLATERAIS SÃO FUNDAMENTALMENTE EXTENSÕES DAS VÁRIAS AÇÕES FARMACOLÓGICAS DOS FENOTIAZÍNICOS. OS MAIS IMPORTANTES SÃO OS EFEITOS SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL, O SISTEMA CARDIOVASCULAR E O SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO. EFEITOS COLATERAIS NO SISTEMA CARDIOVASCULAR INCLUEM HIPOTENSÃO, BRADICARDIA, HIPOTERMIA E TAQUICARDIA REFLEXA. SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL PODEM PRODUZIR: SONOLÊNCIA, APATIA, EXCITAÇÃO PARADOXAL EM ANIMAIS PREDISPOSTOS E DIMINUIÇÃO DO LIMIAR CONVULSIVO. EM RAZÃO DA VASODILATAÇÃO ESPLÊNICA, A ACEPROMAZINA PODE AUMENTAR A ESTOCAGEM DE HEMÁCIAS NO ÓRGÃO, REDUZINDO OS VALORES DE HEMATÓCRITO, NÃO DEVENDO, PORTANTO, SER EMPREGADA EM ANIMAIS ANÊMICOS. EFEITOS EXTRAPIRAMIDAIS (MOVIMENTOS MUSCULARES INVOLUNTÁRIOS), TREMORES E DISTONIA SÃO EFEITOS COLATERAIS RAROS. EVENTUALMENTE, PODEM OCORRER REAÇÕES IDIOSINCRÁTICAS A ACEPROMAZINA EM ALGUNS ANIMAIS, CARACTERIZADA POR EXCITAÇÃO PARADOXAL E DESORDENS COMPORTAMENTAIS ADVERSAS.

MODO DE USAR

Administrar por via oral.

Cães e gatos: 0,56 mg/kg a 3 mg/kg de peso corporal, ou seja, 2 a 6 gotas por kg de peso corporal, dependendo da profundidade e duração da sedação requerida. Os efeitos sedativos em cães iniciam-se 15 a 30 minutos após administração, proporcionando 45 a 120 minutos de sedação. Em gatos, os efeitos Sedativos iniciam-se 15 a 45 minutos após administração, proporcionando 45 a 105 minutos de sedação. Caso seja necessária uma complementação da dose, esta deverá ser realizada sob supervisão do médico veterinário. Cada 1 ml contém 24 gotas. As dosagens poderão ser alteradas de acordo com a orientação do médico veterinário.

NÍVEIS DE GARANTIA

Cada 100 mL contém:

Acepromazina	1,0 g
Veículo q.s.p	100 mL

APRESENTAÇÃO

Frasco conta-gotas contendo 10mL.

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR E SEMPRE FECHADO. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CONSERVAR EM

TEMPERATURA ENTRE 15°C A 30° C. APÓS ABERTURA DO FRASCO, UTILIZAR O PRODUTO EM 4 MESES.